

Katarakt - Enquete 2022


Katja Christina Schielke

Lars Holm

15 har svaret


Region

15 responses




1. Hovedbeskæftigelse for dig og dermed gældende for dine svar i aktuelle enquete

15 responses




2. Hvor ligger den første kontrol efter en ukompliceret standard katarakt-operation hos en rutineret kirurg?

15 responses




3. Hvor mange procent af patienterne, hvor begge øjne opskrives til operation i UA, bliver opereret samme dag på begge øjne?

15 responses




4. Hvor mange procent af patienterne, hvor begge øjne opskrives til operation i LA, opereres samme dag på begge øjne?

15 responses




5. Hvad indeholder det postoperative drypperegime til en standard ukompliceret katarakt-patient?

15 responses




6. Ordineres antibiotika evt. i kombination med steroid i det postoperative drypperegime til en standard ukompliceret katarakt-patient?

15 responses




7. Tilbydes multifokale/EDOF linser til non-presbyope patienter, hvor synspotentialet er godt og hvor det i øvrigt ikke er kontraindiceret?

15 responses




8. Tilbydes multifokale/EDOF linser til presbyope patienter, hvor synspotentialet er godt og hvor det i øvrigt ikke er kontraindiceret?

15 responses




9. Fra hvilken corneal astigmatisme og uden egenbetaling overvejes tilbud om toriske IOL's?

15 responses




10. Ved manglende mulighed for implantation af linse i sækken eller i sulcus og hvor iris er intakt, hvilken kirurgisk metode vælges da som første valg?

15 responses




11. Hvilke metoder anvendes i oplæring af katarakt-kirurger?

15 responses




12. Til hvor stor en andel af klinikkens patienter anvendes monofokale IOLs mhp. mini-monovision (ca. emmetropi på dominante øje og -1,00 til -1,50 D (sfærisk ekvivalent) på non-dominante øje

15 responses




13. Til hvor stor en andel af klinikkens patienter anvendes monofokale IOLs mhp. monovision (ca. emmetropi på dominante øje og -2,00 til -2,50 D (sfærisk ekvivalent) på non-dominante øje)?

15 responses




14. Anvendes tryksænkende dråber efter en standard ukompliceret kataraktoperation hos patienter uden glaukom?

15 responses




15. Hvilken tryksænkende medicin anvendes efter en ukompliceret kataraktoperation hos patienter med glaukom, der ikke har dræn/fået filtrerende operation?

15 responses



16. Foretager din klinik mindst 1 gang årligt intern opgørelse mhp. refraktivt outcome og komplikationsfrekvens?

15 responses



Kommentar på enqueten

4 responses

ad 9 : ved mod-reglen astigmatisme overvejes fra 1,5 D, ellers fra 2 D

ad. 14 : alle får en dråbe lopidine efter operationen, men pt skal ikke selv dryppe med tryksænkende dråber hjemme

Glæder mig til at se resultatet

#7 disse patienter har vi ikke, så svaret kan ikke bruges

#9 egenbetaling er irrelevant ift hvornår der lægges torisk IOL

Supplerende til 7+8: Tecnis Eyhance linsen tilbydes til udvalgte pt.

